



Department of biology



Department of biology

((تصنيف النبات))

Stage two

المحاضرة السابعة

By


م.م سماهر سعد هادي

جهاز التأنيث (المتاع) GYNOECEIUM

يتألف الجهاز الانثوي في الازهار من مدقة واحدة Pistil او عدد من المدقات، ان الاغلبية العظمى من النباتات الزهرية يتألف جهاز التأنيث فيها من مدقة واحدة، ويحتل جهاز التأنيث مركز الزهرة، ان الوحدة الاساسية التي تتكون منها اية مدقة هي الكريلة Carpel وتسمى احيانا **Megasporophyll**. الكريلة هي ورقة سبورية محورة تحمل البويضات Ovules وهي في الاصل تركيب شبيه بالورقة من الناحية التشريحية خالية من الكلوروفيل، كما ان حافتيها قد انطوت باتجاه بعضها او مع حافات كريلات اخرى واتحدت هذه الحافات لتكون تركيب مغلق هو المبيض ويمكن ملاحظة ذلك في بعض العائلات البدائية Primitive Families كالعائلتين Winteraceae و Degeneriaceae اللتين لا تزالان تحتفظان ببعض الصفات البدائية للكريلة من حيث كون حافتيها غير ملتحمة ولا يتميز القلم والميسم بوضوح ، ويطلق على المدقة العقيمة الاصطلاح **Pistillode** .

يمكن تعريف الكريلة بانها ورقة سبورية محورة تحمل الوريقات اذ النفت حافتا الورقة لتكون ما يسمى بالتندريز البطني Ventral suture اما العرق الوسطي وبعد انطواء الورقة يسمى بالتندريز الظهري Dorsal suture وتندعى الفجوة المتكونة بالمسكن او الغرفة Locule في هذه الحالة تكون البويضات مرتبطة على تركيب يشبه الوسادة يدعى بالمشيمة Placenta (تجمع Placenta=Placentae) .

Carpel evolution




انواع جهاز التأنيث:

تصنف المدقات تبعا لعدد الكريلات المتكونة منها الى ما يلي:

- 1 - وحيد الكريلة Monocarpous = Unicarpous : حيث تتألف المدقة من كريلة واحدة كما في الباقلاء *Vicia* .
- 2 - متعدد الكريلات Polycarpous (Polycarpellary) : ويتألف جهاز التأنيث من عدد من الكريلات ويكون بحالتين :
 - أ - منفصل الكريلات Apocarpous: وفي مثل هذه النوع يلاحظ العديد من الكريلات الحرة كما في ورد الاشرفي *Rosa* و *Ranunculus* .

ب- المتحد الكريلات Syncarpous: تكون الكريلات متحدة وتكون تركيب مفرد كما في ورد البوري *Petunia*.



أجزاء المدقة : Pistil Parts

تتألف المدقة النموذجية من ثلاث أجزاء هي :

1. المبيض Ovary: وهو الجزء القاعدي المتضخم من المدقة ويحمل بداخله تراكيب صغيرة تدعى بالبويضات Ovules.
2. القلم Style: وهو الجزء الاسطواني (غالباً) ويشبه الأنبوب ويحتل الجزء الوسطي .
3. الميسم Stigma: وهو جزء المدقة الذي يستقبل حبوب اللقاح ويكون سطح الميسم غير مستوي فهو مزود بشعيرات او حليمات ويفرز سائلا وقت الإخصاب يسمى بالعصير الميسمي Stigmatic Liquid (Fluid) ويكون لزج الملمس وظيفته هي :
أ- مسك حبوب اللقاح و حفظها من السقوط .
ب- يساعد على انتفاخ حبوب اللقاح مما يساعد على نمو انبوب اللقاح .

ويمكن تحديد عدد كريلات المدقة استنادا الى واحد او اكثر من الاسس التالية :


- 1 - عدد فصوص المبيض كما هو الحال في نبات الجيرانيوم *Geranium* والجنس *Euphorbia*.
- 2 - عدد غرف المبيض كما في ورد البوري *Petunia* والجنس *Phlox*.
- 3 - عدد المشايم الجدارية (في المبيض المركب) كما في الجنس *Viola* والشجر *Cucurbita*.
- 4 - عدد الاقلام او فروع القلم كما في الكتان *Linum* والحامول *Cuscuta*.
- 5 - عدد فصوص الميسم او فروعه كما في ورد الشمس *Helianthus* وورد التفون *Ipomoea*.

أنواع المياسم Stigma Types:

الميسم هو جزء المدقة الذي يقوم بمهمة استلام حبوب اللقاح والتي تنمو بمساعدة السائل الميسمي وذلك لان الميسم يحتوي على انسجة غدية فارزة تفرز السائل الميسمي وقد يكون هذا السائل حلو المذاق ويتخذ الميسم اشكالا مختلفة منها :

- 1 - الراسي Capitata: متوسع ومدور كما في الحامول *Cuscuta* .
- 2 - القرصي Discoid: مسطح ودائري كما في الجنس *Oxalis* و الجنس *Hibiscus* .
- 3 - الخطي او الشريطي Linear: كما في المنيد *Convolvulus* .
- 4 - الريشي Plumose: كما في الحنطة *Triticum* والشعير *Hordeum* .
- 5 - المشرش او المشعر Fimbriate : كما في القرنفل *Dianthus* .
- 6 - المفصص Lobed (Bilobed – Trilobed) .
- 7 - الضامر Obsolete: كما في بعض انواع العائلة الصليبية *Cruciferae* .
- 8 - المنتشر Diffuse او المشع Radiate: كما في الخشخاش *Papaver* .

STIGMA TYPES




القلم Style :

القلم هو جزء المدقة الذي يصل المبيض بالميسم ويكون القلم عادة اسطواناني - او يشبه الانبوب ويختلف في طوله من نوع لأخر ويمكن تحديده بسهولة غير انه قد يكون صغير وغير واضح في نباتات معينة وفي هذه الحالة يوصف ب Obsolete او Obseure أي ضامر .

يتخذ القلم اشكالا مختلفة فقد يكون خيطي Filiform عندما يكون بشكل اسطوانة صلبة وهذه هي الحالة الاعتيادية في النباتات او يكون تويجي Petaloid عندما يكون مسطحا وملونا كما في السوسن *Iris* والموز الفحل *Canna indica* ويكون معدوم في الخشخاش *Papaver* ، قد تكون الاقلام متباينة في


اطوالها ضمن افراد النوع الواحد وتدعى هذه الحالة بتباين الاقلام **Heterostyly** كما تكون فاقدة القلم منتفخة احيانا فيسمى **Stylopodic** او معقوفا **Geniculate** او مشعر **Fimbriate** . في حالة كون القلم غير مجوف تكون الخلايا بداخله مستطيلة ورخوة وضعيفة التماسك غدية الوظيفة كثيفة الساييتوبلازم كبيرة النوى وتفرز سائلا هلاميا وقد يكون القلم مجوف كما في البنفسج *Viola* .

STYLE TYPES



موقع القلم من المبيض **Position of Style**:


- 1 - قمي او طرفي **Terminal**: ينمو القلم من قمة المبيض وهي الحالة الشائعة في معظم النباتات كما في عين اليزون *Vinca* .
- 2 - الجانبي **Lateral**: ينشا القلم من جانب المبيض ويكون بثلاث حالات:
 - أ- البطني **Ventral**: وفيه يقع القلم على امتداد التدريز البطني **Ventral Suture** كما في اللبلاب *Dolichus* والياقلاء *Vicia* .
 - ب- الظهر **Dorsal**: وفيه يقع القلم على امتداد التدريز الظهر **Dorsal Suture** كما في منقار الطير *Delphinium* .
 - ج- القاعدي **Basal**: ينمو من الجزء السفلي من المبيض ويمتد جانبيا كما في الشليك *Fragaria* .
- 3 - قاعدي مركزي او متاعي قاعي **Gynobasic**: في هذه الحالة يكون المبيض مؤلفا من اربعة فصوص ويرتفع القلم من قاعدة المبيض ويصعد الى الاعلى من بين الفصوص الاربعة وتوجد هذه الحالة في العائلتين الشفوية **Labiatae** وورد لسان الثور **Boraginaceae** قد يبقى القلم ملازما للمبيض حتى الى ما بعد الاخصاب كما في بعض البقوليات والعائلة الشقية ولهذه الخاصية اهمية في تشخيص الانواع وحيانا يترك ندبة صغيرة او يتوسع عند القاعدة فيسمى **Stylopodium** .



المبيض Ovary :

وهو الجزء الأسفل من المئقة والذي يحمل البويضات Ovules عادة والمبيض اما يكون بسيط Simple وهو الذي يتكون من كربة واحدة كما في منقار الطير *Delphinium* والبقلاء *Vicia*، او ان يكون مركب Compound Ovary وهو الذي يتكون من كرتلتين او اكثر وتكون هذه الكرتلات متحدة كما في الشبوي *Mathiola* والشجر *Cucurbita*.

في حالة استقرار المبيض على التخت الزهري مباشرة وهي الحالة الشائعة وفيها يوصف المبيض بأنه جالس Sessile Ovary، اما اذا كان محمولا على حامل يفصل بينه وبين التخت يوصف بأنه معنق Stipulate ويدعى العنق بحامل التأنيث Gynophore في حالة حمله للمئقة بمفردها كما في الشفاح *Capparis* وخف الجمل *Bauhinia* واذا ما حمل هذا الحامل على المئقة والاسدية دعي بحامل التذكير والتأنيث Androgynophore = Gynoandrophore كما في ورد الساعة *Passiflora*.



التميشم Placentation :

المشيمة هي عبارة عن وسادة لحمية تتصل في منطقة التدريز البطنى Ventral Suture وتتصل بها خيوط قصيرة تحمل في نهايتها البويضات Ovules وتدعى بالحبال السرية Funiculi (مفردها Funiculus). ويعرف نظام توزيع المشايم وببوضها داخل المبيض بالتميشم Placentation وتكون كما يلي :

1. التمشيم الحافي Marginal Placentation: المبيض بسيط مكون من كريمة واحدة ووحيد الغرفة والبويضات مرتبطة بمنطقة مفردة متكونة من التحام الحافات البطنية للكريمة المفردة كما في الباقلاء *Vicia* والفاصولياء *Phaseolus* .

2. التمشيم الجداري Parietal Placentation: المبيض مركب ووحيد الغرفة والمشيمة تتكون عند التحام حافات الكريبات، وعدد المشايم يعتمد على عدد الكريبات الملتحمة كما في ورد الصورة *Viola* وورد الساعة *Passiflora* .


3. التمشيم الصفائحي Lamellate Placentation: في هذه الحالة تبرز حافات الكريبات الملتحمة الى الداخل ولكنها لا تلتقي مع بعضها في المركز وتكون مشيمة صفائحية، ويكون المبيض هنا وحيد الغرفة ويمكن اعتبار هذا النوع من التمشيم هو نوع من التمشيم الجداري كما في الخشخاش *Papaver* والشفلح *Capparis* .

4. التمشيم المحوري Axile Placentation: يكون المبيض في هذه الحالة مركب وعديد الغرف أي انه مقسم بواسطة حواجز Septa الى عدد من الفسحات او الغرف او المساكن (Loculi) (مفردتها Locule) . اما البويضات فتكون مرتبطة الى عمود مركزي Central Axis يتكون نتيجة التحام الحافات الداخلية للكريبات في وسط المبيض هذا وان عدد الغرف يعتمد على عدد الكريبات على انه لا يدخل في حساب الحواجز تلك النوع منها والذي لا يمثل حافة الكريمة والذي يسمى بالحاجز الكاذب False Septum كما في الجنس *Phlox* او ورد اللهب، ان الحاجز Septum (Pl.Septa) يعني جدار فاصل وهو على نوعين :

أ- الحاجز الحقيقي True Septum: وهو الحاجز الذي يتكون من التحام الحافات الداخلية للكريمة
ب- الحاجز الكاذب False Septum: وينشأ هذا كنمو من جدار المبيض كما في الكتان *Linum* او من المشيمة كما في الشبوي *Matthiola* والشجر *Cucurbita* ويسمى Replum يوجد هذا النوع من التمشيم المحوري في العديد من العائلات كالعائلة الباذنجانية Solanaceae والزنبقية Liliaceae والمظلية Umbelliferae .

5. المركزي الحر او الطليق Free – Central Placentation: هنا يكون المبيض مركب ولكنه وحيد الغرفة Compound & Unilocular وتتصل البويضات الى عمود مركزي كما في القرنفل *Dianthus* من العائلة القرنفلية Caryophyllaceae والرميمنة من العائلة الربيعية Primulaceae .

6. التمشيم القاعدي الطليق Free – Basal Placentation: هذا النوع يشبه النوع السابق الا ان المحور المركزي طليق دائما وقصير وان البويض هنا عديدة كما في نباتات العائلة Portulacaceae.
7. التمشيم القاعدي Basal Placentation: المبيض وحيد الغرفة والبويضة واحدة واحيانا اكثر غير انها مستقرة على القاعدة كما في ورد الساعة الرابعة (لثة عباس) *Mirabilis* والطرفة *Tamarix* وورد الشمس *Helianthus*.
8. التمشيم القمي المعلق Apical Pendulous Placentation: ويكون المبيض مكون من غرفة واحدة او عدة غرف والبويضات معلقة بمشيمة واحدة في قمة المبيض كما في الجزر *Daucus* والبردي *Typha*.



موقع المبيض Ovary Position:


ان موقع المبيض يعتمد على موقع الاجزاء الزهرية Floral Parts (الكاس والتويج والاسدية Stamens) بالنسبة الى المبيض ووضعها على التخت Receptacle ويمكن تقسيم الازهار بالنسبة لموقع المبيض الى ما يلي:

1. الزهرة السفلية الاعضاء Hypogynous Flowers: في هذه الحالة يكون التخت بشكل قبوي Dome- Shape (محدب) او مسطح وعناصر الزهرة تترتب بصورة افقية واحدة فوق الاخرى ويوصف المبيض بانه علوي Superior أي ان الاعضاء الزهرية تقع اسفل المبيض وتوصف الزهرة بانها سفلية الاعضاء وعلوية المبيض Hypogynous Flower & Superior Ovary مثال ورد البوري *Petunia*.

2. الزهرة المحيطة الاعضاء Perigynous Flower: وهي ازهار تمتاز بتختها الكوبي او الانبوبي الشكل والذي يسمى (Hypanthium) Floral Cup or Tube في هذا النوع توجد ميزتان لعلاقة المبيض بالأعضاء الزهرية والانبوب الزهري. فان استقر المبيض في قعر الانبوب دون ان يتحد به بأي شكل من الاشكال وخرجت الاعضاء الزهرية الباقية من حافة الانبوب الزهري في هذه الحالة

تسمى الزهرة محيطية الاعضاء *Perigynous Flower*، اما المبيض فيكون مرتفع كما في المشمش والاشرفي . اما اذا اتحد الجزء القاعدي من المبيض بالانبوب الزهري وخرجت بقية الاعضاء الزهرية كما في الحالة السابقة تسمى الازهار في هذه الحالة *Perigynous Flower with Half or Semi inferior* كما في البربين واليلندر *Portulaca* وبعض نباتات العائلة الاسمية كالكالبتوز *Eucalyptus*.

3. الزهرة العلوية الاعضاء *Epigynous Flower*: في هذه الحالة يلتحم الانبوب الزهري او النخت كليا بالمبيض وتسمى الزهرة في هذه الحالة بزهرة علوية الاعضاء سفلية او منخفضة المبيض *Epigynous flower with Inferior Ovary* كما في Cucurbitaceae الفرعية النرجس *Narcissus*.



هناك نظريتان لتفسير وضع المبيض المنخفض هما:

1. نظرية التخت *Receptacle Theory*: في هذه النظرية يعتقد بان نسيج التخت هو الذي ينمو مكونا الانبوب الزهري الذي يحيط بالمبيض ويندمج بجداره فتصبح الزهرة علوية الاعضاء او انه ينمو بهيئة تركيب مجوف كما في الزهرة المحيطية الاعضاء.
2. نظرية اللواحق *Appendicular Theory* وتعزز هذه النظرية تكون الانبوب الزهري نتيجة لاتحاد قواعد الاسدية والبتللات والسبلات لتكون النسيج الذي يغمر المبيض داخله.

تستند النظريتان على أسلوب توزيع الاوعية الناقلة في الازهار ، فالأزهار مرتفعة المبيض تنشا الاوعية الناقلة للحلقات الزهرية بصورة مستقلة وبصورة مباشرة من الاسطوانة الوعائية للساق. وفي حالة وجود انبوب زهري سوف تظهر فروقات تشريحية فعندما ينشا الانبوب من التخت وتنثني الاوعية الناقلة الذاهبة الى الكرايل وتهبط من اعلى الانبوب الزهري الى موقع المبيض اما إذا كان المنشأ هو التحام قواعد الاجزاء الزهرية فان مسار كل حزمة يكون مستقلا عن مسار الحزم الاخرى.