

الاحياء المجهرية النظري

Microbiology

المرحلة الاولى

د. احمد جميل الطائي

طريقة تحضير شريحة بكتيرية Smear

- تؤخذ شريحة زجاجية نظيفة وتوضع فوقها قطرة ماء بواسطة Loop.
- تسحب مسحة من النمو البكتيري من مزرعة البكتريا ويمزج جيداً مع قطرة الماء على الشريحة مع نشرها بواسطة Loop على مساحة ١ سم^٢ دائري واحد .
- يجفف مزيج البكتريا وقطرة الماء على الشريحة تجفيفاً هوائياً ثم تثبت بإمرار الشريحة على اللهب وبذلك يتحقق التصاق الخلايا بالشريحة .
- يضاف لها بضع قطرات من صبغة Crystal violet البنفسجية او صبغة Safranin الحمراء وتترك دقيقة ثم تغسل تحت تيار خفيف من ماء الحنفية وتترك لتجف .
- توضع قطرة من زيت السيدر في وسط الشريحة وتفحص بالمجهر الضوئي عند قوة التكبير ١٠٠ X .

تصبغ البكتريا Bacterial Staining

- تمتاز بعض الأحياء المجهرية بشفافيتها العالية وهذا يعني إنها تسمح بمرور الضوء من خلالها بكثافة عالية تقارب كثافة الضوء المار من خلال الشريحة الزجاجية تقريباً ، عليه فأن رؤيتها تحت المجهر وهي بحالتها الاعتيادية غير المصبوغة لا تكون واضحة أي إنها لا تتميز كثيراً من الشريحة الزجاجية ومن هنا يتم تصبغ Staining خلايا الأحياء المجهرية ولاسيما البكتريا ، بعبارة أخرى يمكن أن تلخيص الغرض الأساس من تصبغ البكتريا كما يلي :
- جعل الخلايا البكتيرية قابلة للرؤيا تحت المجهر على نحو واضح .
 - التصبغ يساعد في تمييز الأشكال الخارجية للبكتريا وتمييز بعض أجزائها كالسبورات (Spores) والكبسولة (Capsule)
- الصبغات (Dyes) هي مواد كيميائية مؤلفة من جزئين أحدهما عضوي وهو المسؤول عن التصبغ (أي منح خلايا البكتريا لون الصبغة) ويسمى Chromophore والجزء الثاني غير عضوي مكمّل قد يكون أيوناً سالباً أو موجباً مثل صبغة الميثيلين الأزرق الذي يتألف من جزء عضوي موجب وجزء غير عضوي هو أيون الكلور السالب .

تقسيم الصبغات : يتم تقسيم الصبغات على أساسيين :

أولاً : تقسيم على أساس الشحنات التي تحملها الأجزاء العضوية المسؤولة عن التصبغ أي من الناحية الكيميائية إلى :

١. الصبغات القاعدية Basic dyes ومثال عليها :

Methylene Blue لون الصبغة الأزرق

Malachite Green لون الصبغة الأخضر

Safranine لون الصبغة احمر أو وردي

Crystal Violet لون الصبغة بنفسجي

ويكون الجزء العضوي في هذه الصبغات حاملاً لشحنة موجبة أما الجزء اللاعضوي فتكون سالبة .

١. الصبغات الحامضية Acidic Dyes ومثال عليها :

Acidic Fuchsin

Nigrosine

ويكون الجزء العضوي في هذه الصبغات حاملاً لشحنات سالبة والجزء اللاعضوي المكمل يكون موجباً .

ثانياً: تقسيم على أساس الغرض من استخدامها أي الغرض من عملية التصبغ :

١. التصبغ البسيط Simple Stain

وفيه يستخدم صبغة واحدة في جميع مراحل التصبغ مثل Methylene Blue ، Crystal Violet ، Safranine حيث يتم من خلاله استعمال

الصبغة البسيطة لملاحظة البكتيريا فقط من غير ان نميز بين Gram Ve + أو Gram Ve –

خطوات التصبيغ البسيط :

- أ- توضع قطرة من الصبغة المطلوبة (صبغة الميثيلين الازرق) على الغشاء المحضر وتترك لمدة ٢-٣ دقائق .
 - ب- تغسل الصبغة بإمرار ماء حنفية جاري خفيف على الغشاء المصبوغ .
 - ت- تجفف الشريحة هوائياً أو باللهب ثم تفحص الخلايا تحت المجهر على القوة الكبرى تحت العدسة الزيتية.
١. الصبغات التفرقية Differential Stain ومثال عليها :

Acid-Fast Stain ، Giemsa Stain ، Grams Stain وفيها تستخدم أكثر من صبغة واحدة خلال مراحل التصبيغ وبالنتيجة تكتسب خلايا البكتريا لون صبغة واحدة من هذه الصبغات وليس جميع الصبغات المستخدمة وتفيد هذه الصبغات في تمييز البكتريا إلى مجموعتين أو أكثر اعتماداً على لون الصبغة المكتسبة، وسيأتي تفصيل تصبيغ البكتريا بصبغة كرام لاحقاً.

١. الصبغات السالبة Negative Stain

ويقصد بها الصبغات الحامضية وهذه لا تصبغ البكتريا نفسها وإنما محيط البكتريا تاركة البكتريا تبدو شفافة تحت المجهر.

١. الصبغات المتخصصة Special Stain

وهذه الصبغات تستخدم لتصبيغ أجزاء معينة من البكتريا كالسبورات Spore Stain والكبسولة Capsule والاسواط Flagelia Stain دون أجزاء الخلية الأخرى .

التصبين السالب Negative Staining


يهدف هذا النوع من التصبين إلى التعرف على الشكل المورفولوجي للبكتيريا حيث يستخدم فيه صبغات حامضية أي التي تتنافر مع خلايا البكتيريا ذات الطبيعة الحمضية أيضاً فيحدث إن الصبغة لا تدخل إلى داخل الخلية البكتيرية ولا تتصبغ بها فتبقى الصبغة خارج الخلية وتعمل على تلوين محيط الخلية بلون الصبغة المستخدمة .

وتتم عملية التصبين باتباع الخطوات التالية :

١ . توضع قطرات من صبغة النيكروسين (Nigrosin) قريباً من إحدى نهايتي الشريحة .

٢ . تؤخذ مسحة من النمو البكتيري من المزرعة بواسطة Loop تمزج مع الصبغة على الشريحة .

يتم نشر مزيج النمو البكتيري والصبغة على طول الشريحة بإمرار حافة شريحة ثانية نظيفة ويوزع المزيج على طول الشريحة الأولى .



١. تترك الشريحة إلى أن تجف تماماً وتفحص تحت المجهر باستعمال العدسة الصغرى ثم الزيتية حيث تلاحظ الخلايا شفافة (غير مصبوغة) تلاً في محيط أسود مصبوغ بلون صبغة النيكروسين الأسود .

ملاحظة : ليست هنالك معاملة حرارة أو تثبيت البكتريا بطريقة تحضير الغشاء في هذه الطريقة وبهذا تختلف هذه الطريقة عن باقي طرق التصيبغ الأخرى.