



أسم المادة : تحليلات عددية
أسم التدريسي : م. د. مروان عباس مظلوم
المرحلة : الثالثة
السنة الدراسية : 2025 - 2026



3. Numerical Solution of Ordinary Differential Equation

المقصود بحل أي معادلة تفاضلية هو إيجاد دالة خالية من المشتقات وإمكانها تحقيق المعادلة التفاضلية وتحقيق بعض الشروط الابتدائية والحدودية. المعادلات التفاضلية التي سوف يتم التطرق لها هي معادلات تفاضلية من

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \text{ التي سوف تكون بالشكل التالي:}$$

هنالك عدة طرق لحل المعادلات التفاضلية منها:



3.1 Euler's Method

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق لحل المعادلات التفاضلية، وبشكل عام تعتبر هذه الطريقة غير دقيقة في إيجاد الحلول العددية للمعادلات التفاضلية الاعتيادية.

$$\text{Slop} = y'_o = \frac{y_1 - y_o}{h} \rightarrow$$

$$y_1 = y_o + h y'_o \rightarrow$$

$$y_{i+1} = y_i + h y'_i$$



ملاحظة: المتطلبات الواجب توفرها عند الحل:

1. الدالة $\frac{dy}{dx}$

2. القيمة الابتدائية ل x_0 و y

3. قيمة h

Example (1): Find the solution of differential equation by using Euler's Method at $x = 0.25$, $\frac{dy}{dx} = x^2 + 4x - \frac{1}{2}y$, if it's known that $x_0 = 0, y_0 = 4, h = 0.05$.

Solve:

$$y_{i+1} = y_i + h \dot{y}_i$$

$$y_{i+1} = y_i + 0.05 (x_i^2 + 4x_i - \frac{1}{2}y_i)$$

$$x_0 = 0, y_0 = 4$$

$$y_1 = 4 + 0.05 ((0)^2 + 4(0) - \frac{1}{2}(4)) = 3.9$$

$$x_1 = 0.05, y_1 = 3.9$$

$$y_2 = 3.9 + 0.05 ((0.05)^2 + 4(0.05) - \frac{1}{2}(3.9)) = 3.81$$

$$x_2 = 0.10, y_2 = 3.81$$

$$y_3 = 3.81 + 0.05 ((0.1)^2 + 4(0.1) - \frac{1}{2}(3.81)) = 3.73 \dots \dots \text{continuous}$$

i	x_i	y_i (Num.)	y_i (Ana.)
0	0	4	4
1	0.05	3.9	3.91
2	0.10	3.81	3.82
3	0.15	3.73	3.76
4	0.20	3.67	3.70
5	0.25	3.62	3.65

H.W: use Euler's Method, solve the following differential equation at $x = 2$

$$\dot{y} = 2 + \sqrt{xy}, \text{ use } x_o = 1, y_o = 1, h = 0.2.$$

H.W: Solve the following differential equation by using Euler's Method,

$$\text{at } x = 2, \dot{y} = x + \sin x + y, \text{ use } x_o = 0, y_o = 0.5, h = 0.5.$$

3.2 Taylor Series Method

هذه الطريقة أكثر تعقيدا من الطريقة السابقة ولكن نسبة الخطأ فيها قليلة (أكثر دقة). القانون العام لهذه الطريقة

هو:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\dot{y}(x_i, y_i)}{1!} h + \frac{\ddot{y}(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \frac{\overset{\cdot}{\ddot{y}}(x_i, y_i)}{3!} h^3 + \dots \dots \dots + \frac{y^n(x_i, y_i)}{n!} h^n$$

if $i = 0$ then;

$$y_1 = y_o + \frac{\dot{y}(x_o, y_o)}{1!} h + \frac{\ddot{y}(x_o, y_o)}{2!} h^2 + \frac{\overset{\cdot}{\ddot{y}}(x_o, y_o)}{3!} h^3 + \dots \dots \dots + \frac{y^n(x_o, y_o)}{n!} h^n$$

ملاحظة: لتبسيط الحل سوف نستخدم 4 حدود فقط من المعادلة في حل الأمثلة وفي الامتحان.

Example (2): Find the solution of differential equation by using Taylor Method

at $x = 0.1$, $\dot{y} = x + y$, if it's known that $x_o = 0$, $y_o = 1$, $h = 0.05$.

Solve:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\dot{y}(x_i, y_i)}{1!} h + \frac{\ddot{y}(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \frac{\overset{\cdot}{\ddot{y}}(x_i, y_i)}{3!} h^3$$

$$i = 0: (x_o, y_o) \rightarrow (0, 1)$$

$$y_1 = y_o + \frac{\dot{y}(x_o, y_o)}{1!} h + \frac{\ddot{y}(x_o, y_o)}{2!} h^2 + \frac{\overset{\cdot}{\ddot{y}}(x_o, y_o)}{3!} h^3$$

$$y_0 = 1$$

$$\dot{y}(x_0, y_0) = x + y = 0 + 1 = 1$$

$$\dot{\dot{y}}(x_0, y_0) = 1 + \dot{y} = 1 + 1 = 2$$

$$\dot{\dot{\dot{y}}}(x_0, y_0) = 0 + \dot{\dot{y}} = 2$$

$$\therefore y_1 = 1 + \frac{1}{1!}0.05 + \frac{2}{2!}0.05^2 + \frac{2}{3!}0.05^3$$

$$y_1 = 1.0525$$

$$i = 1: (x_1, y_1) \rightarrow (0.05, 1.0525)$$



$$y_2 = y_1 + \frac{y'(x_1, y_1)}{1!}h + \frac{y''(x_1, y_1)}{2!}h^2 + \frac{y'''(x_1, y_1)}{3!}h^3$$

$$y_1 = 1.0525$$

$$\dot{y}(x_1, y_1) = x + y = 0.05 + 1.0525 = 1.1025$$

$$\ddot{y}(x_1, y_1) = 1 + \dot{y} = 1 + 1.1025 = 2.1025$$

$$\dot{\dot{y}}(x_1, y_1) = 0 + \dot{y} = 2.1025$$

$$\therefore y_2 = 1.1025 + \frac{2.1025}{1!}0.05 + \frac{2.1025}{2!}0.05^2 + \frac{2.1025}{3!}0.05^3$$

$$y_2 = 1.1103$$

$$(x_2, y_2) \rightarrow (0.1, 1.1103)$$

i	x_i	y_i
0	0	1
1	0.05	1.0525
2	0.10	1.1103

Problems:

1. Use Taylor Method to solve the following differential equation at $x = 4$. 1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + y}, \text{ use } x_o = 4, y_o = 4, h = 0.1.$$

2. Use Taylor Method to solve the following differential equation at $x = 0$. 2

$$\frac{dy}{dx} = x^2y - 1, \text{ use } x_o = 0, y_o = 1, h = 0.1.$$

3. Use Taylor Method to solve the following differential equation at $x = 0$. 4

$$\frac{dy}{dx} = -2x - y, \text{ use } x_o = 0, y_o = -1, h = 0.2.$$