

تفاعلات الظلام في التركيب الضوئي

Dark Reactions of Photosynthesis

تحدث في الحشوة stroma او الـ matrix في الكلوروبلاست.

اساس تجارب Benseng Calven هو ان النبات يحول CO_2 في النهاية الى سكر كلوكوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. ووجد ان عملية التركيب الضوئي الجارية لمدة قصيرة (سبع ثوان) من وجود $^{14}\text{CO}_2$ تسبب تكون (12) مركب وسطي مشع، وعند تقصير مدة التعرض الى CO_2 الى خمس ثوان فقط وجد ان معظم الاشعاع قد تركز في الحامض المسمى phosphoglyceric acid (3-PGA). وبذلك يعد الـ PGA اول مركب ينتج في التركيب الضوئي.

بعد اكتشاف اول ناتج من التركيب الضوئي بدأ البحث عن المادة الاولية التي تتحد مع CO_2 لتكوين PGA وحصل Calvin على ادلة تبين ان السكر المكون من خمس ذرات كاربون (Rudp) هو المكتسب الاول لـ CO_2 اثناء عملية التركيب الضوئي وكان من تلك الادلة انه لاحظ تغير مهم في تركيز PGA و Rudp عند الظلام حيث يزداد تركيز PGA ويقل Rudp مما يدل على ان التفاعل او اتحاد CO_2 مع Rudp هو تفاعل غير معتمد على الضوء.

استمرت البحوث في معرفة الانزيم الذي يساعد في اتحاد CO_2 مع Rudp لانتاج جزيئتين من PGA وتم عزل الانزيم المثبت لـ CO_2 واعطى اسما وصفيا Ribulose diphosphate carboxylase ظهر هذا الانزيم في عدة نباتات.

دورة كالفن

استطاع كالفن ومساعده اثبات تفاعلات بشكل سلسلة دائيرية اطلق عليها اسم Calvin-Bensen Cycle وحازا عليها جائزة نobel عام (1961) وبصورة عامة يكون التفاعل التالي





هذا ويستعمل F-6-p في تكوين الكلوكوز والسكر والنشا والسيليلوز وغيرها. اهمية الدورة

- 1- وسيلة لتثبيت CO_2 (حدوث تفاعلات الظلام) والمحافظة على نسبته في الجو.
- 2- وسيلة لتحرير O_2 والمحافظة على نسبته في الجو.
- 3- وسيلة لتنظيم تفاعلات الضوء وذلك باستغلال الطاقة (ATP) والقوة الاختزالية NADPH_2 .


4- وسیلة لتكوين المواد العضوية كالكاربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والقلويات العضوية وغيرها

التفاعلات التالية تكون بشكل دورة تعيد نفسها

Keto CO₂, Keto acid, H₂O



ممكن ان يتتحول مركب Fructose 1,6-diphosphate الى مركب 3-p-glyceraldehyde والذى سيفقد الفوسفات ليتحول الى Sucrose ثم يعطي الاخير Fructose 6-phosphate. او يمكن ان يتتحول مركب Sedoheptulose 1,7-P-dihydroxyacetone ثم الى 3-p-glyceraldehyde ثم الى Sedoheptulose 7-p



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

دورة كالفن هي ليست الدورة الوحيدة لتشبيط الكربون كما لوحظ في عدة كائنات حية عدم تجمع السكر السادس (الكلوکوز) من التركيب الضوئي وان نسبة تركيز R-diph-carboxylase العالية في الاوراق تسمح بحدوث التركيب الضوئي حتى في ظروف قلة CO₂ وعليه افترض وجود بدائل لتشبيط CO₂ واستمرت البحوث في هذا الاتجاه وسجلت ملاحظات:

1. ان اوراق قصب السكر والذرة تتطلب شدة ضوئية عالية لتعطي اعلى معدل للتركيب الضوئي.

جامعة المستقبل فسيولوجيا النبات أ. د. مجید كاظم الحمزاوي

2. تركيز CO_2 اللازم للحصول على أعلى معدل للتركيب الضوئي في هذه النباتات يكون قليلاً إذا ما قورن بمعظم النباتات الأخرى.

3. هذه النباتات تستطيع القيام بالتركيب الضوئي بكفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة نسبياً .(35C)

4. عملية التركيب الضوئي فيها لا ترتبط بوجود O_2 (كما الحال في نباتات C3).

5. هذه النباتات تثبت CO_2 إلى حامض ذي أربعة ذرات كاربون (Malic acid , Aspartic acid , Oxaloacetic acid)

هذه النتائج أيداها Slack , Hatch في استراليا ووجد أن الناتج الأول من تثبيت CO_2 في أوراق قصب السكر هو Oxaloacetic acid وسميت هذه النباتات C4 وفيها يجري التفاعل التالي بمساعدة إنزيم phosphoenol pyruvate carboxylase (PEP-carboxylase)



Pyruvic acid

هذا التفاعل يتم بمساعدة إنزيم PEP carboxylase

6. هذه النباتات تظهر خصائص تشريرية للورقة حيث تمتلك نوعين من الانسجة الكلوروفيلية وهي خلايا الـ bundle sheath وخلايا النسيج المتوسط وتحوي الأولى PI والثانية تحوي كل من PI R-dip , PII ، كما ان كلوروبلاست الـ bundle sheath تحتوي على تركيز عالي من إنزيم - PEP carboxylase في حين تحتوي كلوروبلاست الميزوفيل على نسبة عالية من إنزيمات - carboxylase

وتعملية تثبيت CO_2 في الـ C4 او ما تسمى (Dicarboxylic acid) طريقة كفؤة لتحويل CO_2 إلى مواد عضوية ويمكن القول ان C4 او ما يسمى Hatch-slack plants تمتاز بما يلي:

1. تستطيع اجراء التركيب الضوئي بكفاءة عالية بوجود تراكيز واطنة من CO_2 .

2. شدة الإضاءة اللازمة لاعطاء أعلى معدل للتركيب الضوئي هي عالية.

3. تستطيع انجاز التركيب الضوئي بكفاءة عالية في درجات حرارة عالية (35C).

جامعة المستقبل فسيولوجيا النبات أ. د. مجید كاظم الحمزاوي

4. قابليتها العالية لنقل المواد الكاربوهيدراتية.

5. عدم نشاط عملية التنفس الضوئي photorespiration في C₃ plants مقارنة بـ C₄ plants (وهي عملية تحدث في الـ bundle او جسيمات اخرى بسبب انزيم Glycolic acid plants .oxidase

6. تستطيع نباتات C₄ المقاومة والعيش في ظروف عسيرة بسبب قلة الماء حيث تتم عملية التركيب الضوئي حتى في حالة غلق الثغور وقلة CO₂.

Succulents

تثبيت CO₂ في النباتات العصارية
هذه النباتات تفتح ثغورها في الليل وتثبيت CO₂ الى الاحماض العضوية وخصوصا malic acid وبسبب ان نباتات عائلة crassulaceae ذات عمليات حيوية غير اعتيادية لذلك اطلق عليها

Grassulacean acid

malate ووجد ان اول ناتج من تثبيت CO₂ في هذه النباتات هو — metabolism (CAM)
كما ان احماض Isocitrate و citrate تشقق من هذا الحامض بتفاعلات دورة Krebs
كما ان انزيم PEP carboxylase هو المسؤول عن تثبيت CO₂ في الليل بعكس نباتات C₄
الذى يكون فيها انزيم PEP carboxylase ذو الفة واطئة في الليل وان انزيم Ru-
dip-carb يكون فعالا في النهار.

تثبيت CO₂ في الظلام في الجذور
فضلا عن تثبيت CO₂ المعتمد على الضوء بالتركيب الضوئي فان CO₂ يمكن ان يثبت بالجذور في
النباتات في الظلام والطاقة اللازمة لذلك فهي ATP و NADPH₂ الناتجة من التنفس.
وفيها يتكون Oxaloacetate (OAA) بمساعدة انزيم PEP carboxylase ثم تختزل Pyruvate
الى حامض malate ثم ازالة مجموعة الكاربوكسيل من الماليت لتكوين